

Antiepileptikumok – szuicid magatartás

A PhVWP által 2008 júliusában jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg

Alkalmazási előírás

4.4 fejezet

Öngyilkossági gondolatok és magatartást jelentettek olyan betegek esetében, akik különböző indikációban szedtek antiepileptikumokat. Antiepileptikumokkal végzett, randomizált, placebo – kontrollos vizsgálatokból készített meta-analysisben is megfigyelték az öngyilkos gondolatok és magatartás előfordulásának kisfokú növekedését. Ennek a rizikónak a mechanizmusa nem ismert, a rendelkezésre álló adatok alapján nem zárható ki, hogy *<az antiepileptikum neve>* szedése során is jelentkezhetnek ilyen tünetek.

A betegeket monitorozni kell az öngyilkossági gondolatok és magatartás vonatkozásában, és amennyiben szükséges, megfelelő kezelést is kell alkalmazni. A betegeket (és gondozóikat) megfelelő tanáccsal kell ellátni, hogy öngyilkos gondolatok illetve magatartás jelentkezése esetén forduljanak orvoshoz.

Betegtájékoztató

„2. bekezdés mielőtt Ön beveszi *<az antiepileptikum neve>*

Fordítson figyelmet a következőre

Antiepileptikumokkal, mint *<az antiepileptikum neve>* kezelték között a betegek kis részénél előfordult, hogy olyan gondolataik támadtak, hogy megöljék magukat. Ha ilyen gondolatai támadnak, azonnal lépjen kapcsolatba kezelőorvosával.