

# Ibuprofen

## Alkalmazási előírás

### 4.5

Vizsgálati adatok alapján feltételezik, hogy együttadáskor az ibuprofen gátolhatja a kis dózisú aszpirin thrombocytá aggregációt gátló hatását. Azonban ezen adatok korlátai és az ex vivo adatok klinikai körülményekre történő bizonytalan extrapolálhatóságának köszönhetően nem lehet határozott következtetéseket levonni rendszeres ibuprofen használat esetére, pedig klinikailag releváns hatás nem valószínűsíthető alkalmoszerű alkalmazás esetén (lásd 5.1 fejezetet).

### 5.1

Vizsgálati adatok alapján feltételezik, hogy együttadáskor az ibuprofen gátolhatja a kis dózisú aszpirin thrombocytá aggregációt gátló hatását.

Egy vizsgálatban egyszeri 400 mg dózisú ibuprofent adtak a 81 mg azonnal oldódó aszpirinnal együtt (az aszpirin adása előtt 8 órán belül illetve után 30 percen belül). Azt találták, hogy csökkent az acetyl-szalicilsav thromboxán képződést illetve thrombocytá aggregációt gátló hatása.

Azonban ezen adatok korlátai és az ex vivo adatok klinikai körülményekre történő bizonytalan extrapolálhatóságának köszönhetően nem lehet határozott következtetéseket levonni rendszeres ibuprofen használat esetére, pedig klinikailag releváns hatás nem valószínűsíthető alkalmoszerű alkalmazás esetén.

## Betegájékoztató

Mit kell kerülnie amennyiben a készítményt szedi?

Egyes véralvadásgátló gyógyszerek (például acetyl-szalicilsav/aszpirin, warfarin, ticlopidin), egyes magasvérnyomás ellenes gyógyszerek (ACE-gátlók (pl. captopril), béta receptor blokkolók, angiotensin II receptor blokkolók), és egyéb gyógyszerek is befolyásolhatják az ibuprofen kezelést, illetve az ibuprofen is befolyásolhatja a fenti gyógyszerek hatását. Ezért mielőtt az ibuprofent más gyógyszer(ek) mellett kezdené szedni, mindenképp kérje ki orvosa véleményét.

---

## Aszpirin

### 4.5:

Lásd ibuprofennél.

### 5.1:

Lásd ibuprofennél.

## Betegájékoztató

A kezelés hatásosságát befolyásolhatja, amennyiben az aszpirint a következő javallatokban adott gyógyszerekkel együtt szedi:

- Véralvadás-gátlás (például warfarin)
- Szervátültetés utáni kilökődés megelőzésére (például cyclosporine, tacrolimus)
- Magasvérnyomás (például vízhajtók és ACE-gátlók)
- Fájdalom és gyulladásos folyamatok (például szteroidok és gyulladásgátlók)
- Kősvény (probenecid)
- Rosszindulatú betegség vagy reumás ízületi gyulladás (methotrexate).

Az aszpirin kezelés megkezdése előtt tájékoztassa kezelőorvosát arról, hogy milyen egyéb gyógyszereket szed.

Amennyiben új gyógyszert kezdene el szedni a rendszeresen alkalmazott aszpirin mellett, kérje ki orvosa véleményét (nem vényköteles készítmények esetén is).