

# **Apomorfin tartalmú készítmények és a QT-távolság megnyúlásának kockázata**

## **Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2009 októberi állásfoglalása alapján**

*Doc. Ref.: CMDh/PhVWP/007/2009  
2009 október*

### **ALKALMAZÁSI ELŐIRAT**

#### ***QT-távolság megnyúlása***

#### ***4.4 pont - Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések***

Mivel az apomorfin -különösen magas dózisban- potenciálisan kiválthat QT-megnyúlást, körültekintéssel kell eljárni torsades de pointes arrhythmia tekintetében veszélyeztetett betegek kezelésekor.

#### **4.5 Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók**

Apomorfin alkalmazása kerülendő más olyan gyógyszerekkel, melynek ismert QT-megnyúlást okozó hatása.

### **BETEGTÁJÉKOZTATÓ**

#### **Tudnivalók az apomorfin szedése előtt**

#### **Ne szedje ezt a készítményt, és tájékoztassa kezelőorvosát, ha:**

-Önnek, vagy valamelyik családtagjának ismert EKG (elektrokardiográfia) eltérése van, melyet úgy neveznek, hogy „hosszú QT szindróma”.

#### **Az apomorfin fokozott elővigyázatossággal alkalmazható**

#### **Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha:**

Olyan gyógyszereket szed, melyek ismert hatással vannak az Ön szívverésére.

Ilyenek lehetnek a szívritmuszavarok kezelésére szolgáló gyógyszerek (pl. kinidin és amiodaron), a depresszió kezelésére szolgáló gyógyszerek (beleértve a triciklikus antidepresszánsokat, mint az amitriptilin és az imipramin) a bakteriális fertőzések kezelésére szolgáló ("makrolid" antibiotikumok, például az eritromicin, klaritromicin és az azitromicin) valamint a domperidon.