

## **Nemszelektív alfa – blokkolók és foszfodiészteráz - 5 – inhibitorok egyúttadása következtében kialakuló további vérnyomáscsökkentő hatás**

### **A PhVWP által 2009 februárjában jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg**

#### **Alkalmazási előírás**

##### 4.4 fejezet

„Phosphodiesterase-5-inhibitorok (pl. sildenafil, tadalafil, vardenafil) és (...) együttes alkalmazása egyes betegek esetében tüneteket okozó vérnyomáscsökkentéshez vezethet. Ha a beteg alfa – blokkoló terápiáját stabilan beállítják a phosphodiesterase - 5 – inhibitor kezelés megkezdése előtt, a posturális hypotenzio kialakulásának az esélye minimálisra csökkenthető.”

##### 4.5 fejezet

„Phosphodiesterase-5-inhibitorok (pl. sildenafil, tadalafil, vardenafil) (l. 4.4)”  
(A 4.5 fejezet egyedi struktúrájától függően bevezető fejezettel lehet kezdeni; pl.: „Phosphodiesterase-5-inhibitorok (pl. sildenafil, tadalafil, vardenafil) és (...) együttes alkalmazása egyes betegek esetében tüneteket okozó vérnyomáscsökkentéshez vezethet)

#### **Betegtájékoztató**

„Vannak betegek, akik magas vérnyomásuk vagy prostata megnagyobbodásuk miatt alfa blokkolót szednek, hirtelen leülésnél vagy felállásnál szédülést vagy feledékenységet tapasztalnak. A betegek egy része ezeket a tüneteket akkor tapasztalja, ha erektilis diszfunkció (impotencia) kezelésére szednek gyógyszert alfablokkoló terápia mellett. Ilyen tünetek megjelenésének elkerülése miatt Önnek szabályos napi adagolású alfablokkoló terápián kell lennie, mielőtt az erektilis diszfunkció kezelésére való gyógyszer szedését elkezdi.”