

**Csomagolásonként 400 mg vagy annál több kámfort tartalmazó kenőcsök  
véletlen lenyelésének kockázata**

**Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2010 júliusi állásfoglalása  
alapján**

*Doc. Ref.: CMDh/PhVWP/023/2010  
2010 július*

**ALKALMAZÁSI ELŐIRAT**

**4.9 pont túladagolás**

Túladagolása bőrirritációt okozhat.

*Helytelen használat:*

A kenőcs lenyelése gastrointestinalis tüneteket okozhat, mint a hányás és a hasmenés. A kezelés tüneti. Akut mérgezést figyeltek meg jelentős mennyiség véletlenszerű fogyasztását követően hányingerrel, hányással, hasi fájdalommal valamint fejfájással, forgó jellegű szédüléssel, melegségérzettel / kipirulással, görcsrohammal, légzési nehezítettséggel és kómával. A súlyos gastrointestinalis és neurológiai tüneteket mutató mérgezett beteget tünetileg kell kezelni. Nem szabad hánytatni.

**BETEGTÁJÉKOZTATÓ**

**3. pont**

Abban az esetben, ha egy gyermek véletlenül (terméknév)-t nyelt le, fontos, hogy haladéktalanul forduljon orvoshoz, aki azonnal biztosítani tudja a szükséges kezelést. Ne próbálja meg hánytatni.